Suterra[®]

Los SEMIOQUÍMICOS y su uso en el control de plagas: SISTEMAS DE A&K

Cristina Alfaro Cañamás
Dr. Ingeniero Agrónomo
calfaro@suterra.com

Lleida, 22 de noviembre de 2012

ÍNDICE

- Fundamentos básicos de semioquímicos
- Proceso de obtención de un producto final basado en feromonas
 - Identificación y aislamiento
 - Síntesis química
 - Bioensayos
 - Formulación
 - Aplicación en campo
- Uso de las feromonas y semioquímicos en el control de plagas
- Sistemas de Atracción y Muerte

¿Qué es el olor?

- ❑ Es un sentido fundamental para la mayoría de los animales
- ❑ Interviene en la comunicación con respecto a:
 - ❑ Alimentación
 - ❑ Seguridad
 - ❑ Ambiente social
 - ❑ Comunicación sexual

¿Cómo huelen los insectos?

Mezclas complejas:

- en Abejas y Hormigas
 - Alimentación
 - Seguridad
 - Ambiente/Status social
 - Sexual, etc...

Mezclas simples o compuestos únicos

- En lepidópteros
 - Alimentación
 - Sexual

Generalized glandular structures of a hypothetical ant.

FUNDAMENTOS

- Percepción del olor

La nariz del insecto

FUNDAMENTOS

- Clave de reproducción de las **polillas**: FEROMONAS

- MENSAJE DE LA HEMBRA

- **Quién soy**
- **Dónde estoy**

- Para el MACHO....

- **Debe responder**
- **Debe encontrarla**

FUNDAMENTOS

MAYOR ATRACCIÓN CROMÁTICA
MENOR ATRACCIÓN OLFATIVA

¿Por qué no es posible
"CONFUSIÓN SEXUAL" en todos
los insectos"

¿Por qué el "TRAMPEO
MASIVO"/"A&K" NO FUNCIONA
EN TODAS LAS ESPECIES?

MENOR ATRACCIÓN CROMÁTICA
MAYOR ATRACCIÓN OLFATIVA

Terminología

INTRODUCCIÓN A LAS FEROMONAS

¿Qué son?

- Las feromonas son compuestos químicos que emitidos por un organismo provocan una reacción específica de comportamiento en otros individuos de la misma especie.

Tipos de feromonas

- Sexual – Atraen machos
- Agregación – Atraen ambos sexos
- Rastro (hormigas)
- Alarma...
- Para-feromonas: Son compuestos sintéticos, con una función similar pero no se emiten de forma natural (Trimedlure)

¿ POR QUÉ EL USO DE FEROMONAS EN AGRICULTURA?

- Evolución a una agricultura más sostenible
- Normativa Europea (Directiva 91/414)
- Nuevos LMR

MÉTODOS BASADOS EN SEMIOQUÍMICOS

- Su eficacia ha sido demostrada muchas especies.
- Son métodos muy específicos.
- Son respetuosos con el medio ambiente.
- No aportan residuos nocivos al producto final.

● ESTRATEGIAS DE LUCHA

BIOLOGÍA ECOLOGÍA QUÍMICA

AGRONOMÍA

¿CÓMO conseguir un producto final para su uso en el control de plagas?: LA BIOTECNOLOGÍA APLICADA A LA AGRICULTURA

Intentamos IMITAR a la naturaleza

IDENTIFICACIÓN: Técnicas de volátiles aplicadas a feromonas

ELECTROANTENOGRAFÍA (EAG)

Consiste en medir la diferencia de potencial entre el ápice y la base de la antena al pasar un determinado compuesto

GC-MS-EAD

EAG response to wheat volatiles

Dedo humano como atrayente de mosquitos

Aedes aegypti

SÍNTESIS QUÍMICA

CALIDAD DE LA FEROMONA

- Riqueza del componente activo
- Composición precisa de la mezcla

EFICIENTE

- Coste que permita un tratamiento económicamente viable

1. ¿POR QUÉ NO SON EXACTAMENTE IGUALES LAS FEROMONAS DE CONFUSIÓN QUE LAS DE MONITOREO?
2. ¿POR QUÉ DISPONEMOS EN MUCHAS ESPECIES DE FEROMONAS DE MONITOREO Y NO DE CONFUSIÓN?

SÍNTESIS QUÍMICA

1. ¿POR QUÉ NO SON EXACTAMENTE IGUALES LAS FEROMONAS DE CONFUSIÓN QUE LAS DE MONITOREO?

Para conseguir la atracción de un insecto, la feromona (pureza, ratio, isómeros...) debe ser prácticamente igual a la feromona natural.

Para conseguir un efecto de confusión, la exigencia de pureza, ratio, porcentaje de isómero activo... es menor

2. ¿POR QUÉ DISPONEMOS EN MUCHAS ESPECIES DE FEROMONAS DE MONITOREO Y NO DE CONFUSIÓN?

PRECIO DE LA SÍNTESIS

(E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrienyl acetate

(E,Z)-3,8-Tetradecadienyl acetate

90:10

900 €/g

30 €/g

36000 €/ha

1200 €/ha

Evolución en la identificación y aislamiento de las feromonas

<u>1960</u>	<u>1965</u>	<u>1970</u>	<u>1975</u>	<u>1980</u>	<u>1986</u>	<u>1990</u>
1	1	22	80	222	436	800

- ❑ El ritmo en las investigaciones fue lento al principio
- ❑ En los últimos 20 años se ha producido un desarrollo importante de estas investigaciones
- ❑ 2010: Hay más de 8000 semioquímicos descritos y alrededor de 2500 feromonas sexuales de Lepidópteros publicadas.

FORMULACIÓN: ¿Por qué necesitan ser formuladas?

Características

- Moléculas y mezclas muy específicas
- Compuestos volátiles y semivolátiles
- Compuestos inestables
- Son activos a dosis muy bajas

Necesidades

- Emisores de larga duración
- Emisión constante

Solucion

- Sofisticados sistemas de emisión controlada

Tecnología: Importancia en la tasa de emisión. Ejemplos demostrados

Chilo suppressalis

Bactrocera oleae

Ceratitis capitata

Vacas et al. 2009. Journal of Economic Entomology
Navarro-Llopis et al. 2011. Crop Protection
Vacas et al. 2011. Entomologia Experimentalis et Applicata.

Tecnología de emisión: ¿CÓMO controlar la tasa de emisión?

Ciencia del Material

- El material está en función de la sustancia a emitir
- Ejemplo: Densidad de polímeros en función de la volatilidad del compuesto

Forma

- Efecto del viento
- Efecto de la temperatura
- Como incluirlo en una trampa o aplicarlo al cultivo

Superficie de exposición al ambiente

- Efecto del ratio peso/área expuesta
- Ejemplo: Mayor superficie, mayor emisión

Tecnología de emisión: TIPOS de sistemas de emisión

Sistemas de matriz de extrusión

- Compuesto incorporado a la estructura
- Efectivo para bajas y altas dosis

Laminados

De Reserva o Presion de vapor

- Compuesto está almacenado en el interior
- Suele utilizarse para dosis elevadas de feromona

Extrusion

Septa

Laminado

Sacos

Viales

Tecnología de emisión: FACTORES que afectan

- Temperatura
- Viento
- Humedad
- Contaminación

Emisores activos de emisión controlada: PUFFER

Puffer[®]

MONITOREO

- Medir poblaciones y ciclo biológico

CONFUSIÓN SEXUAL

- Prevenir la cópula

TRAMPEO MASIVO

- Capturar tantos individuos como sea posible

ATRACCIÓN Y MUERTE (A&K)

- Atraer el insecto al insecticida

SISTEMAS DE ATRACCIÓN
Y MUERTE:
**UNA APUESTA DE
FUTURO PARA
REEMPLAZAR AL
TRAMPEO MASIVO**

SISTEMAS DE ATRACCION Y MUERTE

***C.capitata* es una de las plaga más importante de la fruticultura en la cuenca Mediterránea.**

- **Datos económicos:**

 - >de 300 especies afectadas (Liquido, 1990)

 - gasto anual directo por los organismos oficiales > 12 millones €

- **Tratamientos actuales:**

 - Prohibición de la mayoría de los organofosforados utilizados hasta la actualidad (91/414)

 - Resistencia a insecticidas organofosforados (Magaña et al., JEE 2008) y resistencia cruzada con otros insecticidas

 - Trampeo masivo: ¿¿¿DDVP???

- **Medioambiental**

 - tratamientos poco específicos generalizados

 - afectación de la fauna auxiliar

SISTEMAS DE ATRACCION Y MUERTE

Distribución geográfica

FACTORES CLAVES PARA DESARROLLAR UN A&K EFECTIVO

- Atrayentes muy potentes y de larga duración
 - *Reducción de dosis (nº dispositivos/ha)*
 - *No reposición*
- Efecto insecticida instantáneo de larga duración
- Biodegradable o recuperable

TRAMPEO MASIVO vs ATRACCIÓN Y MUERTE

- Mayor volumen de manejo
 - Incremento del coste de logística y colocación en campo
- Permite observar los "cadáveres" ----EFECTO PSICOLÓGICO
- Requiere un mantenimiento de las trampas. POSIBLE SATURACIÓN
- Mayor dificultad en manejo de residuos plásticos
- Insecticida?? DDVP?? Alternativas??
- **DURACIÓN**

- **Magnet® Med** es un producto integrado de aplicación directa que se aplica a bajas dosis (50-75/ha)
- Requiere una única aplicación por campaña
- Duración: **6 meses**
- Formulación insecticida muy potente a baja dosis
- Alto poder de atracción : **Biolure® Unipack**
- Respetuoso con el medio ambiente: Se retira fácilmente del campo
- El insecticida no entra en contacto directo con la fruta
- Fácil de integrar con otros medios de lucha contra *Ceratitis capitata*
- Bajo efecto contra fauna útil
- Permitido en Agricultura Ecológica en Europa (EU Directiva 2092/91)

TRAMPEO MASIVO vs ATRACCIÓN Y MUERTE

- Mayor volumen de manejo
 - Incremento del coste de logística y colocación en campo
- Permite observar los "cadáveres"----EFECTO PSICOLÓGICO
- Requiere un mantenimiento de las trampas. POSIBLE SATURACIÓN
- Mayor dificultad en manejo de residuos plásticos
- Insecticida?? DDVP?? Alternativas??

- **DURACIÓN**

DURACION DEL INSECTICIDA

DURACION DEL ATRAYENTE

Average of captured females during 60 days

CONCLUSIÓN: Duración 6 meses en condiciones de campo

NUEVA ESTRATEGIA DE LUCHA

¿COMO EVALUAR AL EFICACIA EN UN SISTEMA A&K?

- Ensayos sobre zonas aisladas o con trampeo perimetral
- Evaluación de la población de **HEMBRAS**
- Evaluación del daño en fruto
- Evaluación durante 2 años para poder ver efectos acumulativos
- Atracción y muerte ¿sólo o combinado con otras técnicas?

2010. Sagunto

2010. Sagunto. Fruit damage at harvest

Navarro-Llopis et al. 2012. Pest Management Science

2011. Gandía

Navarro-Llopis et al. 2012. Pest Management Science

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN